


# Paniculitis

## Panniculitis

Lais Gomes Barbosa<sup>1</sup>, Sabrina Meik<sup>1</sup>, Mariana Arias<sup>1</sup>



**Fecha de recepción:** 17/7/2009 | **Fecha de aprobación:** 1/9/2009

1. Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich". CABA, Rep. Argentina.

### Correspondencia

Dra. Lais Helena Gomes Barbosa Cunha: Guardia Vieja 4176 2do B, CABA, Rep. Argentina | lalacunha@yahoo.com.br

## Definiciones

### Horizontales

1. Tratamiento de elección en la paniculitis lúpica.
3. Enfermedad de pacientes con insuficiencia renal crónica caracterizada por placas eritematovioláceas simétricas ulceradas en miembros.
7. Causa frecuente de EN medicamentoso. Dos palabras.
12. Causa más frecuente de EN en los niños en nuestro medio.
14. Nombre con el cual se reconoce la característica clínico-evolutiva de las lesiones en el EN. Dos palabras.
16. Siglas del estudio de laboratorio con el cual puede demostrarse la presencia de ADN de *Mycobacterium tuberculosis* en las muestras de piel de pacientes con EIB.
22. Forma de lepra en la cual se observa frecuentemente el EN leproso.
23. Sexo en el que predomina la paniculitis pancreática.
24. Hallazgo histopatológico en el EIB además de una paniculitis predominantemente lobulillar.
25. Medida que debe indicarse como parte del tratamiento a todos los pacientes con diagnóstico de paniculitis.
27. Lesión elemental en las paniculitis.
28. Población en la cual son más frecuentes las paniculitis infecciosas.
29. Hallazgo de laboratorio que a menudo presentan los neonatos con necrosis del tejido adiposo neonatal.
30. Localización predilecta del EIB.

### Verticales

2. Localización predominante de la paniculitis en la histopatología del EN típico.
4. Paniculitis que se caracteriza por nódulos purpúricos, ulcerados y sobre-infectados, con formas raras, geométricas en sitios inusuales.
5. Sexo en el cual predomina el EN.
6. Nombre del síndrome constituido por EN, sarcoidosis, adenopatías hiliares, fiebre, artritis y uveítis.
8. Forma en la cual se realiza el diagnóstico del EN típico.
9. Paniculitis que se presenta en neonatos con mal estado general, de bajo peso o prematuros, usualmente con enfermedades sistémicas graves. Dos palabras.
10. Principal célula que constituye el tejido celular subcutáneo.
11. Principal hormona que sintetiza y secreta el adipocito blanco.
13. Paniculitis crónica que suele aparecer en miembros inferiores asociada con insuficiencia venosa crónica.
15. Localización del proceso inflamatorio en las paniculitis.
17. Nombre de la paniculitis que resulta de la saponificación de las grasas como consecuencia de la liberación enzimática.
18. Nombre de la enfermedad que produce paniculitis nodular idiopática a menudo asociada con compromiso sistémico. Dos palabras.
19. Nombre que se le da a la paniculitis lúpica cuando afecta la grasa mamaria. Dos palabras.
20. Tipo de crecimiento que presentan las lesiones individuales en el EN crónico o migratorio.
21. Enfermedad infecciosa que se debe estudiar en todo paciente en quien se sospecha EIB.
26. Enfermedad inflamatoria intestinal más ligada al EN.

### ABREVIATURAS

EN: eritema nodoso  
EIB: eritema indurado de Bazin

### Bibliografía recomendada

1. Camillero MJ, Su WPD. Paniculitis. En: Freedberg I, Eisen A, Wolf K, Austen KF, et al. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General, 6ta edición. Editorial Panamericana, Buenos Aires; 2005:1175-1192.
2. Patterson JW. Paniculitis. En: Bologna JL, Jorizzo JL, Rapini RP, et al. Dermatología, 1ra edición. Editorial Elsevier, España; 2004:1551-1570.
3. Saponaro AE, Casas JG, Rossi GC. Paniculitis. En: Programa de Educación a Distancia en Dermatología. PRONADERM 08/09. Sociedad Argentina de Dermatología.