


Alopecia

Sergio Gabriel Carbia¹ y Ulises Chavanne²



Un calvo iba caminando por el medio de la calle y se inclinó para recoger un peine que estaba en el suelo. Otro calvo, que lo vio levantar el objeto, se acercó, y sin saber de qué se trataba le dijo:
–¡Eh, amigo! Yo lo vi al mismo tiempo. Debemos repartir el botín.
–¡Encantado, amigo! ¿Quieres ver de qué se trata? –y al tiempo que hablaba le mostró el peine.
–Es cierto que los dioses quisieron favorecernos. Pero, ¿habrá sido el destino el que nos jugó la mala pasada?

Todos aquellos que han sido engañados en su esperanza alguna vez, pueden participar de este lamento (nota del compilador) (Dermatol. Argent., 2014, 20 (4): 294-295).

Fecha de recepción: 07/04/2014 | **Fecha de aprobación:** 28/04/2014

¹ Docente adscripto en Dermatología (UBA)

² Médico especialista en Dermatología (UBA)

Universidad de Buenos Aires

Correspondencia: Sergio Gabriel Carbia. 12 de Octubre 1027, Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina.
scarbia@intramed.net

El autor, Gayo Julio Fedro

(provincia romana de Macedonia, aprox. 15 a. C. - aprox. 55 d. C.)

Aunque su origen era esclavo y recibió la libertad de manos del emperador Augusto, tuvo una esmerada educación de joven en latín (puesto que su lengua natal era el griego), lo que le permitió ser escritor de fábulas y considerarse heredero de Esopo. Esta modalidad literaria fue inventada por los esclavos que, temerosos del castigo, expresaban lo que sentían de esta manera, evitando con bromas las reacciones violentas de sus amos.

De sus aproximadamente 122 fábulas conocidas agrupadas en cinco libros destacan: “El lobo y el corde-ro”, “La zorra y el cuervo”, “El pastor y la cabrita”, “La mosca y la mula” y la más renombrada, “La zorra y las uvas”. Su obra se caracteriza por la intervención de animales, que enmascaran en ocasiones a personajes de la época, objetos de su crítica moralizante y que en el caso del ministro Sejano (durante el gobierno del emperador Tiberio), le valió su enjuiciamiento y condena, que determinó su posterior caída en desgracia. Este carácter satírico, expresado al inicio o al final de sus obras, conocido como moraleja y escrito en un lenguaje simple y breve, alude a los vicios y costumbres de la sociedad romana de su tiempo.

En una fábula acerca de un poeta muy pobre que viajaba en un barco que naufragó, escribió: “Véis que es cierto que conmigo iban mis bienes. Yo no he perdido ni la más mínima parte de mi tesoro. En cambio vosotros habéis perdido todo aquello por lo que, sin embargo, habéis puesto en peligro vuestra vida”.

Bibliografía

Fedro G. J. Los dos calvos. En Simonini de Fuentes A., Lisa A. Favoritas, 3ª edición, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1978, 25.

DERMATÓLOGOS JÓVENES



CASO CLÍNICO | RESPUESTAS

Respuestas correctas:

1, d; 2, b; 3, b; 4, e

Comentarios

La enfermedad de Fox-Fordyce es un desorden crónico de las glándulas apocrinas. Ocurre más frecuentemente en mujeres de 15 a 35 años.

Si bien la etiología continúa siendo desconocida, se cree que estarían implicados ciertos factores hormonales, estímulos emocionales y físicos.

La clínica se presenta con pápulas foliculares localizadas en axilas, región periareolar y anogenital, generalmente sin cambios de coloración; suelen ser intensamente pruriginosas,¹ aunque mejoran durante el embarazo y la menopausia. Empeoran con el calor y el estrés.

En la histopatología se observa la formación de un tapón de queratina en el infundíbulo folicular que obstruye la salida del conducto glandular. Como

consecuencia de la obstrucción infundibular, se produce la dilatación, ruptura y extravasación de su contenido. También se observa espongirosis e infiltrado linfohistiocitario periglandular. Algunos autores consideran esencial para su diagnóstico la presencia de un infiltrado xantomatoso dérmico perifolicular, aunque no siempre está presente.^{1,2}

Los corticoides tópicos continúan siendo la primera línea terapéutica, pero su uso es limitado por sus efectos adversos a largo plazo. Los inhibidores de la calcineurina tópica favorecen la reducción de las lesiones y producen mejoría sintomática. Los retinoides tópicos, si bien pueden ser útiles, generan gran irritación local. Otros tratamientos propuestos son: clindamicina tópica, anti-conceptivos orales e isotretinoína oral. Todas estas opciones generan alivio temporario y recaída luego de su suspensión.^{3,4}

Se trata de una patología crónica poco frecuente, con múltiples diagnósticos diferenciales. Hasta el momento es decepcionante la respuesta a los diversos tratamientos utilizados.

Bibliografía

1. Kamada A., Saga K. *et ál.* Apocrine sweat duct obstruction as a cause for Fox Fordyce disease, *J. Am. Acad. Dermatol.*, 2003, 48: 453-455.
2. Mataix J., Silvestre J.F *et ál.* Perifollicular xanthomatosis as a key histological finding in Fox-Fordyce disease, *Actas Dermosifiliogr.*, 2008, 99: 145-148.
3. Kao P.H., Hsu C.K. *et ál.* Clinicopathological study of Fox-Fordyce disease, *J. Dermatol.*, 2009, 36: 485-490.
4. Cosulich C., Meik S. *et ál.* Pápulas axilares pruriginosas, *Dermatol. Argent.*, 2012, 5: 405-408.