


Lupus

Lupus

Claudia Cosulich¹, Lucía Nicola² y Sabrina Meik³



Fecha de recepción: 18/04/2015 | Fecha de aprobación: 30/04/2015

¹ Médica dermatóloga

² Jefa de residentes

³ Médica de planta

Unidad de Dermatología, Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Almirante Brown 260, CABA

Correspondencia: dermatoargerich@gmail.com

VERTICALES

2. Alteración hematológica más frecuente en pacientes con lupus neonatal.
4. Síndrome caracterizado por la asociación de LES y lesiones símil eritema multiforme en presencia de marcadores inmunológicos (tres palabras).
5. Sexo que se afecta con mayor frecuencia en esta patología.
6. Anticuerpo monoclonal humano utilizado en el tratamiento de lupus.
8. Tratamiento sistémico de elección en pacientes con LED.
9. Variante rara de LECC que se localiza en zonas acrales y se exacerba con climas fríos.
11. Efecto adverso neurológico provocado por la talidomida (tres palabras).
12. Efecto adverso más frecuente de la talidomida.
13. Disposición de los anticuerpos en la zona de la membrana basal observados con inmunofluorescencia directa (IFD).
15. Factor ambiental que se asocia a exacerbaciones de la enfermedad (dos palabras).
16. Sigla del subtipo de lupus que típicamente se asocia a fotosensibilidad y anticuerpos anti-Ro.
18. Diagnóstico diferencial del LECSA con lesiones eritematoescamosas.
19. Tinción histológica utilizada para evidenciar el engrosamiento de la membrana basal.
23. Fármaco que puede desencadenar un LECSA inducido por drogas.
24. Nombre propio del síndrome caracterizado por la presencia de dedos en cuello de cisne y desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas.

HORIZONTALES

1. Nombre de la forma más frecuente de lupus eritematoso cutáneo crónico (tres palabras).
3. Nombre propio del signo que hace referencia a la afectación de la mucosa, semimucosa y piel adyacente del LECC.
7. Fármacos utilizados en el tratamiento de lesiones recalcitrantes de lupus verrugoso o hipertrófico.
10. Manifestación cutánea que se relaciona con la presencia del anticuerpo anti-RO.
14. Patología cardíaca severa y frecuente en el lupus neonatal (dos palabras).
17. Subtipo de lupus cutáneo crónico que histológicamente se caracteriza por epidermis sin alteraciones y se evidencia depósito de mucina en la dermis.
20. Anticuerpo característico del LES inducido por fármacos.
21. Técnica que se utiliza para poner en evidencia la mucina en la dermis reticular del lupus tumido.
22. Forma clínica de lupus cutáneo crónico que se caracteriza por compromiso del tejido celular subcutáneo (dos palabras).
25. Tipo de glomerulonefritis más frecuente en pacientes con LES (dos palabras).
26. Localización cutánea del *rash* en "alas de mariposa" de las lesiones del lupus eritematoso cutáneo agudo.
27. Lesión inespecífica del lupus relacionada con la presencia de anticuerpos anticardiolipinas y anticoagulante lúpico (dos palabras).
28. Anticuerpo útil para el monitoreo de la actividad de la enfermedad y el control terapéutico.

HORIZONTALES		VERTICALES	
1. Lupus eritematoso discoides	1. Lupus eritematoso discoides	12. Constipación	2. Trombocitopenia
3. Grnspan	3. Grnspan	13. Granular	4. Síndrome de Rowell
7. Retinoides	7. Retinoides	15. Radiación ultravioleta	5. Femenino
10. Fotosensibilidad	10. Fotosensibilidad	16. Lecca	6. Belimumab
14. Bloqueo cardíaco	14. Bloqueo cardíaco	18. Psoriasis	8. Hidroxicloroquina
17. Tímido	17. Tímido	19. Pas	9. Sabañón
20. Antihistonas	20. Antihistonas	23. Hidralazina	11. Neuropatía periférica
21. Azul alcian	21. Azul alcian	24. Jaccoud	sensitiva
22. Paniculitis lúpica	22. Paniculitis lúpica		
25. Proliferativa difusa	25. Proliferativa difusa		
26. Malar	26. Malar		
27. Liveo reticularis	27. Liveo reticularis		
28. Anti-dna	28. Anti-dna		



Bibliografía

1. Kaminsky A., Díaz M., Prada M., Dancziger E. Lupus eritematoso, *Dermatol. Argent.*, 2003, 9: 78-93.
2. Lee L. Lupus eritematoso, en Bologna J.L., Jorizzo J.L., Rapini P.R. *Dermatología*, Elsevier, España, Madrid, 2004: 601-613.