


SECCIÓN DERMATOGRILLA

Embarazo y piel

Pregnancy and the skin

Mariana Arias, María Paula Ces Costa, Laura Romero Costas

Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich". Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rep. Argentina.



HORIZONTALES

2. Enfermedad ampollar a la cual se asemeja el herpes gestacionis. (Dos palabras.)
4. Trastorno hidroelectrolítico raro asociado al impétigo herpetiforme.
6. Lesión cutánea primaria del impétigo herpetiforme.
8. Tipo de efluvio común en el posparto.
9. Dermatitis del tercer trimestre de gestación que se distingue por la ausencia de prurito.
11. Tumor maligno que puede asociarse al herpes gestacional.
12. Grupo de embarazadas en las cuales es más frecuente el PPUPE. (Plural.)
17. Hormonas femeninas responsables de los cambios pigmentarios del embarazo.
18. Mecanismo establecido como patogénico de la erupción polimorfa de embarazo.
20. Estructura hacia la cual están dirigidos los anticuerpos en el herpes gestacional.
23. Nombre que se le da a las lesiones del eritema polimorfo que también pueden hallarse en el herpes gestacional.
24. Disposición de los anticuerpos en la inmunofluorescencia directa en el herpes gestacional.
26. Nombre que se le da a la dermatosis pigmentaria que se da en más del 50% de mujeres durante el embarazo.
27. Síntoma cardinal de la mayoría de las dermatosis durante el embarazo.

VERTICALES

1. Localización inicial del prurito en la colestasis intrahepática del embarazo.
3. Forma de psoriasis pustulosa durante el embarazo. (Dos palabras.)
5. Droga de elección para el tratamiento del impétigo herpetiforme.
7. Condición predisponente asociada por algunos autores al prurigo de Besnier.
10. Hallazgo de laboratorio que puede encontrarse en las pacientes con herpes gestacional.
13. Alteración del tejido conectivo que ocurre en el 90% de las embarazadas. (Plural.)
14. Fármaco utilizado en acné severo, altamente teratogénico.
15. Área respetada por la erupción polimorfa del embarazo.
16. Localización de las lesiones en el impétigo herpetiforme.
19. Lesión cutánea específica de la colestasis intrahepática del embarazo.
21. Tumor gingival que puede darse en las embarazadas.
22. Alteración pilosa que ocurre durante el embarazo y resuelve tras el parto.
25. Sigla con la cual se conoce a la erupción polimorfa del embarazo.

 **Referencias**

- Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, et al. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General, 6° ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
- Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews' Dermatología Clínica, 9° ed. Madrid: Marbán S.L.; 2004.
- Cordero A, Cobreros M, Allevato M, Donatti L. Manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas. Buenos Aires: Ed. Med. Panamericana; 1997.

Respuestas de la Dermatogrilla en la página 150.

**Eritema multiforme persistente, tratado con talidomida**

Dentro de los subgrupos clínicos reconocidos del eritema polimorfo o multiforme, los autores presentan un paciente con una forma persistente, es decir, caracterizada por la aparición de lesiones atípicas sin interrupción. El paciente mostró respuesta al tratamiento con talidomida.

Chen CW, et al.
Am J Clin Dermatol 2008;9:123-127.

U