



## Sección Dermatólogos Jóvenes

# COMPLEJO VARICOSO

Sinónimo: síndrome de insuficiencia venosa crónica.  
 Producido por la alteración del funcionamiento normal del sistema venoso.  
 Es la enfermedad vascular más frecuente. Predomina en el sexo femenino.  
 Presenta diferentes estadios evolutivos con rasgos clínicos principales.

### ESTADIOS

HIPERTENSIÓN VENOSA DISTAL.



EXTRAVASACIÓN DE LÍQUIDO CON ALTA CARGA PROTEICA EN EL INTERSTICIO.



SISTEMA VENOSO Y LINFÁTICO INSUFICIENTES.

1. Linfedema
2. Varículas y várices
3. Angiodermatitis ocre purpúrica y pigmentaria
4. Eccema microbiano
5. Erisipela o celulitis

DEPÓSITO DE HEMOGLOBINA REDUCIDA.



DENSIFICACIÓN DEL COLÁGENO.



HIPOPERFUSIÓN DISTAL. INSUFICIENCIA DEL SISTEMA CAPILAR. APERTURA DEL ESFÍNTER PRECAPILAR (SHUNT A-V).



ALTERACIONES TRÓFICAS, CONSECUENCIA DE LA PRESENCIA DE SHUNTS A-V (SÍNDROME DE HIPEROSTOMÍA).

### CLÍNICA

- Dolor a la bipedestación prolongada, sensación de pesadez, calambres

- Edema



- Dermatoesclerosis

- Úlcera



- Anquilosis articular



Las medidas de compresión durante los primeros estadios mejora la signo-sintomatología y retarda la evolución de la enfermedad.